









## Escuelas del Condado de Watauga CUANDO QUEDARSE EN CASA Y NO ASISTIR A LA ESCUELA...

TENGO FIEBRE	ESTOY VOMITANDO	TENGO DIARREA	TENGO SARPULLIDO	TENGO PIOJOS	TENGO UNA INFECCIÓN EN EL/LOS OJO(S)	TENGO DOLOR DE GARGANTA	TENGO TOS
							
Temperatura de 100°F o más.	Un evento de vómito, o vómitos con sarpullido, fiebre y/o debilidad. Vomitando durante un lapso de 24 horas.	Un evento de diarrea acuosa o diarrea con sarpullido, fiebre o debilidad. Diarrea durante un lapso de 24 horas.	Sarpullido en el cuerpo con fiebre y picazón. <b>Sarna:</b> sarpullido y picazón. <b>Impétigo:</b> ampollas rojas rezumantes con drenaje amarillo. <b>Varicela:</b> si las ampollas no tienen costras y presenta nuevas ampollas en 2 días.	Picazón en la cabeza de piojos vivos o huevos (liendres) que están más cerca de 1/2 pulgada al cuero cabelludo.	Enrojecimiento, picazón y/o drenaje "crujiente" del ojo(s).	Dolor de garganta con fiebre o dolor de garganta severo sin fiebre.	Si la tos es peor de lo que esperarías con un resfriado, o si el/la estudiante tiene problemas para respirar y/o el/a estudiante tiene fiebre con tos.

### YO ESTOY LISTO(A) PARA VOLVER A LA ESCUELA CUANDO...

Libre de fiebre sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas (es decir, Motrin, Advil, Tylenol).	Libre de vomito por 24 horas.	Libre de diarrea por 24 horas.	Libre de sarpullido en el cuerpo sin fiebre ni picazón. <b>Sarna:</b> Quédese en casa por 24 horas después de que comience el tratamiento y que el médico le otorgue el permiso para que regrese a la escuela. <b>Impétigo:</b> llame a su médico para recibir tratamiento y permitirle regresar a la escuela. <b>Varicela:</b> todas las ampollas deben tener costra y no se han presentado nuevas en 2 días.	Todos los piojos vivos han sido removidos. Los huevos (liendres) que están a menos de ½ pulgada del cuero cabelludo se han removidas.	Libre de drenaje y/o picazón y enrojecimiento o ha sido evaluado por su proveedor de atención médica si es necesario.	Si se le diagnostica estreptococo (Infección de garganta) u otra infección bacteriana; el/la estudiante puede regresar después de las primeras 24 horas de haber comenzado a tomar los antibióticos y el proveedor de atención médica le ha dado permiso a su niño(a) para regresar a la escuela.	La tos está más controlada y la tos no distrae a el/la estudiante de las actividades escolares.
--	-------------------------------	--------------------------------	---	---	---	---	---

Usted debe de mantener a su estudiante en casa lejos de la escuela si está demasiado enfermo(a) como para participar cómodamente en el salón de clases y otras actividades escolares. Su estudiante podría transmitir una enfermedad contagiosa a otros estudiantes y/o maestros y personal escolar. Le recomendamos que busque ayuda médica si tiene alguna duda sobre se debe enviar a su niño(a) a la escuela. Su estudiante no debe regresar a la escuela hasta que no tenga fiebre o sin síntomas durante 24 horas o un día escolar. Si su estudiante comienza a mostrar alguna de las señales de enfermedades anteriores, será necesario que recoja a su niño(a). Por favor, mantenga toda la información de contacto de emergencia actualizada. Si un estudiante se enferma o lastima en la escuela, debemos poder comunicarnos con usted rápidamente. Las notas de ausencia se deben enviar al maestro de su niño(a) cuando regrese a la escuela. Por favor, póngase en contacto con la enfermera de su escuela si tiene otras preguntas o inquietudes.